

**CLAVE DICOTÓMICA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE ALGUNOS  
GÉNEROS DE HONGOS ANAMORFOS ( 2014 )**

- 1- Conidios marrones oscuros, siempre septados -----2
  - 2"- Conidios muriformes (con septos transversales y a veces longitudinales), ovoides, sin célula central curvada-----*Alternaria*
    - 2"- Conidios no muriformes (solo con septos transversales), con forma de boomerang y con célula central curvada-----*Curvularia*
- 1"- Conidios nunca marrones oscuros, a veces septados-----3
  - 3- Conidios en forma de medialuna -----*Fusarium*
    - 3"- Conidios diferentes, redondeados o elípticos no en forma de medialuna-----4
      - 4- Conidios con cicatrices en una o ambas caras, colonias siempre verdes oscuras-----  
----- *Cladosporium*
        - 4"- Conidios sin cicatrices en ambas caras , colonias con coloraciones distintas ----- 5
          - 5- Colonias amarillas verdosas de crecimiento rápido -----*Trichoderma*
            - 5"- Colonias no amarillo verdosas sin crecimiento rápido -----6
- 6- Conidióforo que termina en una vesícula globosa-----*Aspergillus*
  - 6"- Conidióforo que no termina en una vesícula globosa, con aspecto de pincel-----7
    - 7- Colonias en general marrones amarillentas con fiálides terminando en largos cuellos-----*Paecilomyces*
      - 7"- Colonias en general verde azuladas (no siempre) con fiálides terminando en cortos cuellos-----*Penicillium*